

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EPIDIDIMITIS

PATOLOGIA	TRATAMIENTO	DOSIS	ALTERNATIVAS
EPIDIDIMITIS Para epididimitis aguda frecuentemente causada por Clamidia y gonococo	Ceftriaxona + Doxiciclina	250 mg IM in dosis única 100 mg orales dos veces al día/ 10 días	
Para epididimitis aguda frecuentemente causada por Clamidia y gonococo y microorganismos entéricos (Hombre que practica sexo anal)	Ceftriaxona + Levofloxacino o Ofloxacino	250 mg IM in dosis única 500 mg orales 1 vez al día/ 10 días 300 mg orales 2 veces al día/ 10 días	
Para epididimitis aguda frecuentemente causada por microorganismos entéricos	Levofloxacino o Ofloxacino	500 mg orales 1 vez al día/ 10 días 300 mg orales 2 veces al día/ 10 días	

Estas son las directrices resumidas de la **actualización de junio de 2015 para las Directrices de la CDC 2010 para el tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual**. Este resumen debe servir como fuente de orientación clínica y terapéutica. Las opciones terapéuticas se han priorizado en base a la eficacia, costo, o por conveniencia. También se debería de evaluar el tratamiento de las parejas sexuales (<http://www.cdc.gov/std/ept/default.htm>)

Direcciones electrónicas donde se puede encontrar la información (En inglés):

<http://www.cdc.gov/std/default.htm> (Información de las ETS-STD)

<http://www.cdc.gov/std/treatment/> (Información del tratamiento de las ETS-STD)

<http://www.cdc.gov/std/tg2015/2015-pocket-guide.pdf> (Guía Resumida)

<http://www.cdc.gov/std/tg2015/2015-wall-chart.pdf> (Tabla de tratamientos)

<http://www.cdc.gov/std/pregnancy/treatment.htm> (Información del tratamiento en el embarazo)